

ブルーベリー

科名	ツツジ科
原産地	アメリカ
性状	落葉低木

制作
JAファーム 専門部会
(無断転載禁止)


1 植え付け

土壤条件 保水性と通気性がよい酸性土(pH4.3~4.8)を好みます。

植え付け

- 時期…春植えがお奨めです。(凍害の心配がありません)
- 植え付け方法…植え穴に15L~30Lの充分湿ったピートモスで根鉢を包み、よく砕いた土を被せます。
- 植え付け後…根元をおさえつけず、十分灌水してください。
灌水後、根元にバーク堆肥や木材チップなどで10cm程度にマルチを行います。

鉢で育てる場合 市販の「ブルーベリー専用培養土」をご利用ください。
酸度調整がされており便利です。



栽植は
並木
植え

マルチング
夏の暑さから
根を守ります

★結実率を高めるポイント★
2~3種類を混色してください。

2 土壤管理

灌水

- 根が細く浅いため乾燥にも加湿に弱い植物です。
- 乾燥期には、4日に1度程度の灌水をしてください。(滞水は避けてください)

施肥


肥料 ・JAファーム果樹専用肥料 有機55%

- 時期
5月中・下旬から6月にかけて2~3回に分けます。
- 施肥量(1本あたり)
・3年樹まで100g
・以降500g
- 施肥場所
株まわり
(株元と枝の先端真下の
同心円状)



3 収穫


- 定植後2~3年は果実をつけないようにします。発芽前に花芽を全て取り去ります。
- 収穫の中心は6月下旬~8月です。
- 1果そう内の果実全てが完熟するには4~6週間かかります。紫色になった果実のみを数回に分けて摘み取ってください。
- 涼しい時間に収穫し、収穫果は、冷蔵庫などに入れ、なるべく早く品温を下げてください。



4 整枝・剪定

- 定植後、2~3年は強い剪定は行わないでください。
- 時期
春の発芽前です。
(厳冬期は切口が凍害を受ける心配があります。)
- 方法
・先端部に多くの花芽がつき、2~3年するとその枝は垂れ下がります。(図の1、2、3)
- そして、その中間から新梢が伸びます。(図の1-①、2-①、3-①)
- 新梢が伸びたところで古い枝を切ります。(図の④)
- 新梢が殆ど発生していない株は、地上1m程度まで全ての枝を切り詰めます。

整枝・剪定って?
樹勢を維持し、大粒果にするための技術です



5 よく見られる害虫

- 斑点病
・5月下旬~9月までみられ、6月中下旬に急増します。
葉に褐色~灰褐色の1cm程度の円形の同心輪紋状を生じ、早期落葉がみられます。
枝梢の整理や密植の解消により風通しをよくしましょう。
- ショウジョウバエ
・成熟果に産卵し果実内を侵食します。
被害果と落果は早急に処分します。
また、過熟にならないように適期収穫に努めましょう。
- コウモリガ
幼虫が、枝幹の樹皮とその内部を食害します。株元に侵入されると枯死の原因になります。
下草の除草に努めてください。



- ◎病虫害防除は予防が大切です。
定期的に行いましょう。
- ◎農薬は使用方法をよく確認し、正しく使いましょう。